

LAGUNE D'AMBATO

ici vivent des Plantes et des Animaux protégés



RÔLE DE CUVIER

Le Rôle de Cuvier est un oiseau appartenant à la famille des rallidés. Cet Oiseau vit à proximité des zones humides, là où il trouve des broussailles qu'il utilise comme protection. Très discret, on a longtemps cru qu'il avait disparu de Mayotte, mais le GEPOMAY a confirmé en 2009 qu'il était encore bien présent sur l'île !

SARI CARIHANI



CRABIER BLANC

Le Crabier blanc est un petit héron caractéristique de l'océan Indien et présent toute l'année à Mayotte. L'espèce est en danger d'extinction au niveau mondial : Seulement 800 couples sont recensés, dont 20% à Mayotte !

CLANDIGNY SOUNGNI MAHITSOU



GECKO DIURNE À LIGNE DORSALE

Le gecko diurne à ligne dorsale ou Phelsuma Robertmertensi est l'un des trois geckos endémiques de Mayotte : il ne vit que sur l'île ! On le reconnaît par sa ligne rouge plus ou moins continue sur le dos. Il est classé « en danger d'extinction » au niveau mondial.

KITSATSKA SILAM



ANGUILLE

C'est une espèce de poissons appartenant à la famille des Anguillidés. Elle mesure de 40 cm à 150 cm et pèse jusqu'à 4 kg pour les femelles. C'est un grand migrateur, et plus précisément un migrateur amphihalal, thalassotoque et catadrome. On peut les observer de très près dans la lagune d'Ambato.

MHOUNGA



PALÉTUVIER À PETITES FEUILLES

Le palétuvier à petites feuilles ou *Lumnitzera racemosa* est l'un des palétuviers les plus éloignés de la mer, car il supporte bien les sols secs. Ambato est la seule mangrove où l'on ne retrouve que cette espèce de palétuviers.

MHONKOU RAVIGNI MADINIKI

Les règles à respecter sur le site
Les sanctions encourues sont punies
d'un an de prison et de 15.000€ d'amende



MASSETTE DE SAINT-DOMINGUE

La Massette de Saint-Domingue (*Typha domingensis*) est une grande herbe pérenne atteignant trois mètres de haut. A Mayotte, elle est indigène et est considérée comme extrêmement menacée, classée en danger critique d'extinction.

VONDROUNGNOU



NÉNUPHAR

Le Nénuphar (*Nymphaeaceae*) est une plante aquatique enracinée dans le sol. cette espèce se rencontre dans des plans d'eau et certains cours d'eau. Elle est considérée comme vulnérable (VU) sur le territoire sur la liste rouge de l'UICN.

VONINKAZOU LILY



SOUCHET ARTICULÉ

Le Souchet articulé (*Cyperus articulatus*) est une herbe de la famille des Cypéracées, haute de 2 mètres et poussant en touffes denses. Espèce largement répandue au niveau mondial, à Mayotte elle n'est connue que sur le site de la lagune d'Ambato à Mtsangamouji.

KARA



PRAIRIE HUMIDE

Une prairie humide ou prairie inondable est une zone constituée d'une végétation herbacée présente en général à proximité des cours d'eau, parfois dans une dépression. Elle favorise l'alimentation des animaux.

MOUINGA



ERYTHRINE

C'est un genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae, sous-famille des Faboideae, à répartition pantropicale, qui comprend 129 espèces acceptées. Ses espèces sont distribuées un peu partout sur le globe dans les régions tropicales et subtropicales. Dans la lagune, les érythrines permettent aux oiseaux de nicher et pendant la période de fleurissement, elles attirent beaucoup les insectes et favorisent l'alimentation des oiseaux.

MOUINGA